



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Λαμία 18-8-14
Αριθμ.Πρωτ: ΤΚ 4605

Ταχ.Δ/νση :Κραββαρίτου 1
Ταχ : 35100 Λαμία
Πληροφορίες: : Ε.Κίττα
Τηλέφωνο : 2231352500
FAX : 2231046007
E-mail : e.kitta@fth.pste.gov.gr

ΠΡΟΣ : Π.Δ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ
Η «ΝΟΣΟΣ ΚΥΑΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»

Λόγω εμφάνισης κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού το Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Φθιώτιδας ενημερώνει :

Ο καταρροϊκός πυρετός είναι ιογενή νόσος που μεταδίδεται με αρθρόποδα αιματοφάγα κουνούπια του γένους *culicoides* .Προσβάλλει όλα τα μурηκαστικά ,αλλά μόνο τα πρόβατα εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα .

- **ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ**
- **ΕΙΝΑΙ ΝΟΣΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ**

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Υψηλός πυρετός μέχρι 42° c,καταβολή
- Οίδημα στην περιοχή του στόματος ,οφθαλμών ,αυτιών.
- Διαυγές ορώδης ρινικό έκκριμα το οποίο γίνεται βλεννοπυώδες
- Φλεγμονή ,εξέλκωση διάβρωση και νέκρωση του στοματικού βλενογόννου ,έντονη σιελόρροια
- Οίδημα και κυανή γλώσσα (σπάνιο)
- Χωλότητα λόγω φλεγμονής της στεφάνης της χηλής και ποδοδερματίτιδα
- Αποβολή ή γέννηση θνησιγενών αμνών
- Απίσχυση
- Εάν δεν συμβεί θάνατος μέσα σε χρονικό διάστημα 8-10 ημερών το ζώο αναρρώνει με συμπτώματα απώλεια μαλλιού ,στειρότητας και καθυστερημένης ανάπτυξης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Δεν υπάρχει καμιά αποτελεσματική θεραπεία για τα άρρωστα ζώα

Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να λάβουν τα εξής μέτρα

- χρήση εγκεκριμένων εντομοαποθηκικών σε όλα τα μηρυκαστικά
- ψεκασμός των στάβλων και γενικώς των χώρων παραμονής με κατάλληλα εντομοκτόνα
- αποφυγή της βοσκής αργά το απόγευμα, όταν υπάρχει έξαρση στα τσιμπήματα των κουνουπιών.

Για όλες τις περιπτώσεις μετακινήσεων ζώντων ζώων

- Τα ζώα να έχουν εξετασθεί κλινικά την ημέρα της μετακίνησης και να μην εμφανίζουν συμπτώματα καταρροϊκού πυρετού
- πριν την μετακίνηση τους να έχει εφαρμοστεί κατάλληλο εντομοαπωθητικό σκεύασμα λαμβάνοντας υπόψη και το σχετικό χρόνο αναμονής για κάθε σκεύασμα σε ότι αφορά τα ζωικά προϊόντα
- Να έχουν εφαρμοστεί κατάλληλα εντομοαπωθητικά και στα οχήματα με τα οποία τα ζώα θα μεταφερθούν πριν την αναχώρησή τους αλλά και μετά την εκφόρτωσή τους
- Οι μετακινήσεις να πραγματοποιούνται εκτός των ωρών δραστηριότητας των εντόμων φορέων (από σούρουπο έως την αυγή.)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου **Απαγορεύεται η διακίνηση ζώντων ζώων χωρίς την έγγραφη άδεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών**

- **ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**

A/A	ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΠΕΡΙΟΧΗ	ΤΗΛΕΦΩΝΑ
1	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	2231022232
2	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ	2231022351
3	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ	2232022277
4	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ	2236043232
5	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ	2238022787
6	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	2234350123
7	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΩΛΟΥ	2235052091 ΕΣΩΤ 29

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

Για την επιβεβαίωση της χρήσης ενός κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος στα παραγωγικά ζώα και τον έλεγχο τήρησης του ενδεδειγμένου χρόνου αναμονής, στην προκειμένη περίπτωση του προγράμματος ελέγχου του Καταρροϊκού Πυρετού, απαιτείται ο έλεγχος της σχετικής **Κτηνιατρικής συνταγής και του Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής της Εκτροφής**, ώστε οι υπηρεσίες σας να εκδίδουν έγγραφα μετακίνησης των ζώων.

ΣΚΕΥΑΣΜΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
BUTOX PROTECT 7,5 mg/ml POUR.ON.SU (Deltamethrin)	Για βοοειδή και πρόβατα Υγρό για επίχυση στην ράχη των ζώων από το κεφάλι έως την ουρά .Επανάληψη κάθε 6-10 εβδομάδες	Βοοειδή : Κρέας και εδάδιμοι ιστοί : 18 ημέρες Γάλα : 0 ημέρες Πρόβατα : Κρέας και εδάδιμοι ιστοί : 1 ημέρα Γάλα : 12 ώρες
DELTANIL 10 mg/ml POUR.ON.SU (Deltamethrin)	Για βοοειδή και πρόβατα Υγρό για επίχυση στην ραχιαία γραμμή στο ύψος των ώμων . Επανάληψη κάθε 6-10 εβδομάδες	Βοοειδή : Κρέας και εδάδιμοι ιστοί : 17 ημέρες Γάλα : 0 ώρες Πρόβατα : Κρέας και εδάδιμοι ιστοί : 35 ημέρες Γάλα : 0 ώρες
ECTOFLY 12,5 mg/ml POUR.ON.SO (Cypermethrin)	Για πρόβατα Υγρό για επίχυση στην ράχη & στο οπίσθιο τεταρτημόριο των ζώων Επανάληψη κάθε 6-8 εβδομάδες	Πρόβατα : Κρέας και εντόσθια : 8 ημέρες Γάλα : Δεν χορηγείται σε ζώα που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση
ECTOPOR 2% (w/v) CUT.SOL (Cypermethrin)	Για βοοειδή ,αίγες και πρόβατα Υγρό για επίχυση κατά μήκος της ράχης των ζώων από το κεφάλι έως την ουρά Επανάληψη κάθε 4-5 εβδομάδες	Βοοειδή : Εδάδιμοι ιστοί : 4 ημέρες Γάλα : 48 ώρες Πρόβατα / Αίγες : Εδάδιμοι ιστοί : 4 ημέρες Γάλα : 96 ώρες

M.E.A
H
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΙΤΤΑ ΕΛΕΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Σύλλογοι κτηνοτρόφων ΠΕ Φθιώτιδας
2. Τμήματα Κτηνιατρικής – Αγροτικά Κτηνιατρεία -ΔΑΟΚ ΠΕ Φθιώτιδας
(Με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους και την ανάρτηση σε εμφανή σημείο)
3. Δήμοι ΠΕ Φθιώτιδας
(Με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους και την ανάρτηση σε εμφανή σημείο)
 - I. Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας
Κάτω Τιθορέα
 - II. Δήμος Λοκρών
Αταλάντη
 - III. Δήμος Δομοκού
Δομοκό.
 - IV. Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου
Καμένα Βούρλα
 - V. Δήμος Στυλίδας
Στυλίδα.
 - VI. Δήμος Λαμιέων
Λαμία.
 - VII. Δήμος Μακρακώμης
Σπερχειάδα