



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΠΟΙΟΤ. & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ. Χαϊνά 93- 341 00 Χαλκίδα
TELEFAX: 22213 53955
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κωνσταντίνος Τζελάς
ΤΗΛ 22213 53920
e_mail: tzelas.k@evia.pste.gov.gr

ΠΡΟΣ

Χαλκίδα 8.3.17
Αρ. Πρωτ.: 43846/3163

1. Οινοποιητικούς & Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Έδρες τους (με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη τους)
 2. ΕΔΑΣ Π.Ε. Εύβοιας & Παραρτήματα αυτής Έδρες τους
 3. Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων ΠΕ Εύβοιας
 4. Δήμους Π.Ε. Εύβοιας Έδρες τους
 5. Τμήματα Αγρ. Οικονομίας Π.Ε. Εύβοιας Έδρες τους
 6. Γραφείο Τύπου Π.Ε. Εύβοιας
- ΚΟΙΝ. 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ^ο. Φάνη Σπανού
Ενταύθα
2. Γραφείο Προϊστάμενου Γενικής Δ/σης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Στ. Τσελά
Υψηλάντη 1-ΛΑΜΙΑ 35100

ΘΕΜΑ: « ΝΕΟΣ ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΑΜΠΕΛΙ ΚΛΠ »

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος των επίσημων Επισκοπήσεων για το έτος 2016 διαπιστώθηκε η πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία στη χώρα μας του επιβλαβούς οργανισμού *Aleurocanthus Spiniferus* (μαύρος αλευρώδης των εσπεριδοειδών) σε δείγμα φύλλων πορτοκαλιάς στην ΠΕ Κερκύρας .

Το *A. Spiniferus* είναι πολυφάγο έντομο και προσβάλλει τα εσπεριδοειδή κατά κύριο λόγο αλλά και το Αμπέλι ,την Αχλαδιά, τη Ροδιά αλλά και άλλα είδη καλλιεργουμένων και καλλωπιστικών φυτών προκαλώντας υποβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων, σημαντική μείωση της παραγωγής και σε περίπτωση πολύ έντονων προσβολών τη ξήρανση βλαστών ,βραχιόνων και ολόκληρου του φυτού .

Τα ενήλικα του εντόμου τοποθετούν τα αυγά τους σε σπειροειδή σχηματισμό στην κάτω επιφάνεια των φύλλων του φυτού σε ομάδες των 35-40 αυγών. Οι προνύμφες είναι μαύρου χρώματος πεπλατυσμένες με πόδια και φέρουν φτερά που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του σώματός με γενικό χρωματισμό μεταλλικό γκρί-μπλέ. Ανοιχτόχρωμα σημάδια στις πτέρυγες σχηματίζουν ταινία κατά μήκος του κόκκινου κοιλιακού τμήματος .

Σε περίπτωση έντονων προσβολών δημιουργούν μεγάλες αποικίες προνυμφών στη κάτω επιφάνεια των φύλλων. Η προσβολή αυτή στα φύλλα δημιουργεί κηλίδες μελιτωμάτων και στη συνέχεια αναπτύσσεται έντονη καπνιά που μειώνει την φωτοσυνθετική επιφάνεια δημιουργώντας προβλήματα θρέψης αλλά και ανάπτυξη δευτερογενών μολύνσεων.

Τα ενήλικα πετούν σε μικρές αποστάσεις προσβάλλοντας το ξενιστή. Η διασπορά των εντόμων σε μεγαλύτερες αποστάσεις πραγματοποιείται με προσβεβλημένα δενδρύλλια που προορίζονται για φύτευση ή εμβολίων.

Μετά τα πιο πάνω και σε περίπτωση που παρατηρήσετε ύποπτα συμπτώματα σε δενδρώδεις καλλιέργειες ή σε χώρους που καλλιεργούνται ευπαθή φυτά παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ
Κτηνίατρος με βαθμό Α΄