



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ : Ποιοτικού & Φυτ/κού Ελέγχου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 35100 Λαμία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι. Ζαρμπούτης/Σπ. Καρίμαλης
/Ι. Καζάνας
ΤΗΛ. : 2231353171/2238022351
/2233351414
FAX. : 2231353154/127

Λαμία 23/05/2017
Αρ.Πρωτ.: 9252/108211

ΠΡΟΣ:

1. Κ. Αγρ. Οικονομίας Αταλάντης και Στυλίδας,

Έδρες τους

2. Δήμος Π.Ε. Φθιώτιδας (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στις Τοπ. Κοινότητες),

Έδρες τους

ΚΟΙΝ:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Γεν. Δ/ντή κ. Στ. Τσελά

ΘΕΜΑ : «ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Διαπιστώσεις: Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου ξεκίνησε στις παραλιακές και στις πρώιμες περιοχές σύμφωνα με συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει αναρτήσει η Υπηρεσία μας. Παρατηρούνται ωοτοκίες στους μικρούς καρπούς μεγέθους άνω των 2 χιλ. της ποικιλίας ελιάς «Κονσερβολιάς» και αναμένονται εκκολάψεις προνυμφών στις πρώιμες περιοχές μετά από επώαση 4-5 ημερών.

Το χρόνο ψεκασμού μας τον καθορίζει ο πληθυσμός του πυρηνοτρήτη, το ποσοστό της καρπόδεσης και το ποσοστό προσβολής (εναποθέσεις αυγών) σε δείγματα καρπών.

Καταπολέμηση: Συνιστάται ψεκασμός κάλυψης:

- Παραλιακές και άλλες πρώιμες περιοχές: Από 28 Μαΐου – 31 Μαΐου
- Ενδιάμεσες περιοχές (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης ζώνης): Από 01 -04 Ιουνίου
- Όψιμες περιοχές : Από 05 – 08 Ιουνίου

Με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά των προνυμφών σε συνδυασμό με ένα καλό διαβρέκτη, όπως Χλωρπυριφώς μεθύλ(διάφορα σκευάσματα), Πυρεθρινοειδή (Δελταμεθρίν, Λάμδα Σουαλοθρίν, Μπέτα-σουλφουθρίν, Πυρεθρίν, διάφορα σκευάσματα), Θιακλοπρίντ+Δελταμεθρίν, Θιαμεθοξάμ+Λάμδα Σουαλοθρίν, Φοσμέτ, Σπινετοράμ (Delegate 250wg). Ο ψεκασμός να γίνει όταν το 70% των καρπών έχει μέγεθος μεγάλου «σκαγιού» (διαμέτρου 3-5 χιλ.).

Για την ποικιλία «Καλαμών» η περίοδος του ψεκασμού μετατίθεται κατά μία εβδομάδα από τις ανωτέρω ημερομηνίες. Σε περίπτωση που μετά τον ψεκασμό σημειωθεί βροχόπτωση ή έχουμε υψηλούς πληθυσμούς και υψηλό ποσοστό εναπόθεσης αυγών στους καρπούς συνιστάται να επαναληφθεί ο ψεκασμός μετά από 10 ημέρες, ανάλογα με το φυτοπροστατευτικό σκευάσμα που έχει χρησιμοποιηθεί και να εναλλάσσονται ανάλογα με την ομάδα δράσης που ανήκουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να τηρούνται αυστηρά σε κάθε περίπτωση οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Να χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα.

Μ.Ε.Αντ/ρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
Βιολόγος – Ιχθυολόγος M.Sc.
με Α΄ βαθμό